

## 「小菜蛾性費洛蒙」農藥使用方法及其範圍

中華民國 112 年 6 月 17 日農授防字第 1121488902B 號公告修正

### 90.5%(w/w) 小菜蛾性費洛蒙 蒸散劑 (VP)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
麥類	小菜蛾	每公頃誘餌數量 120 個					每 8-12 公尺設置 1 個性費洛蒙誘蟲器，每橡皮帽內含費洛蒙 0.45mg；將誘餌放置於黏膠式誘蟲器內，黏板黏滿小菜蛾蟲體時需及時更換；誘蟲盒懸掛高度為作物生長點上方 30-50 公分處。		田間有效期為 2 個月。	本項刪除。
雜糧類										本項刪除。
乾豆類										本項刪除。
包葉菜類										本項刪除。
十字花科包葉菜類										
小葉菜類										本項刪除。
十字花科小葉菜類										
根菜類										本項刪除。
十字花科根菜類										
果菜類										本項刪除。
瓜菜類										本項刪除。
豆菜類										本項刪除。
瓜果類										本項刪除。
果樹										本項刪除。
花木										本項刪除。
特用										本項刪除。